

Az előző három krizantém szezonban sok termelő kipróbálta a Kibo fajtát. Nagyon jó tapasztalatokat szerezünk. A Kibo ígéretes új fajta a nagyvirágú, teljesen fehér, sötétítés nélkül termesztethető vágó fajtakörben. A fajta a Creamist-hez képest hófehér, és megfelelő termesztéstechnológia mellett eléri a Creamist szárhosszúságát.

KIBO NAGYVIRÁGÚ VÁGOTT KRIZANTÉM - TERMESZTÉSTECHNOLÓGIA

A KIBO egy vágó, bimbózást igénylő krizantém fajta a Brandkamp cég kínálatából. Nagyvirágú, virága hófehér és gömb formájú. Előnyei közül kiemelkedő: sötétítés nélkül termesztethető Halottak napjára; a többi fajtával ellentétben a teljes állomány 95%-a értékesíthető, és 1. osztályú minőségű; nem érzékeny a tripszre; alacsony hőmérsékleten, és teljes nyílásban is mindig hófehér marad.



Ültetés

Sötétítés nélküli termesztésben visszavágás nélkül a 24-26. héten, visszacsípéssel a 21-23. héten kell ültetni, hogy 43-44. héten virágozzon. Korábbi virágoztatáshoz szükséges a sötétítés. Sötétítést megelőzően, visszacsípés után 4 hét hosszúnappalra van szükség a megfelelő bimbóképződéshez. Reakcióideje: 8 hét.

Térállás

Visszacsípéssel 28 tő/m² javasolt, a két legerősebb hajtást kell meghagyni, a többi távolítsuk el. Egyszálasként 56 tő/m².

Bimbózás

Minél korábban kezdjük a bimbózást, annál nagyobb lesz a virágzat. Időben elvégezve 13-14 cm lesz a virág átmérője.

Tápanyagutánpótlás

A megfelelő növekedéshez az ültetést követően, az

első öt hétben nitrogén túlsúlyos tápoldatra van szükség. Javasolt N-K arány: 1,5:1. Javasolt EC az ültetőközegben: 1,3. A továbbiakban kiegyenlített N-P-K arányú tápanyag kijuttatása szükséges.

Növekedés-szabályozás

A megfelelő szárstabilitáshoz és magassághoz nem szükséges törpésíteni. Az esetleges hosszú virágnyak ellen közvetlenül az utolsó bimbózás után lehet növekedés-szabályozó szert használni.

Növényvédelem

Kártevőkkel szemben különösebben nem érzékeny. Mivel a fajta nem túlzottan érzékeny a tripszekre, ezért kevésbé érzékeny a TSWV-re (paradicsom bronzfoltosság vírusra). Virodokkal szembeni érzékenysége jelenleg nem ismert.

Szedés

A 60%-os nyílottság az ideális időpont a szedéshez. Virágzata erős és stabil, így kiváló a szállíthatósága a vázatartóssága is.

Részletesebb termesztési tanácsokért forduljon területi képviselőinkhez!